



Werkafspraak NOAC

Overzetten van andere anticoagulantia naar NOAC

Bij gebruik van **acenocoumarol**:

- Laatste INR $\leq 4,0$:
Dag 0: stop acenocoumarol, dag 1: start NOAC.
- Laatste INR $> 4,0$:
Dag 0: stop acenocoumarol, dag 2: start NOAC.

Bij gebruik van **fenprocoumon**:

Stop het cumarinderivaat en bepaal na twee dagen de INR. Indien de INR $< 2,0$ is, start dan de NOAC.

Huisarts:

Opstarten:

- Bepaal de CHA2DS2-VASc score
- Geef adequate voorlichting over NOACs (zie ook www.thuisarts.nl)
- Benadruk het belang van therapietrouw
- Bepaal voordat therapie wordt gestart Kreatinine en eGFR (niet ouder dan 8 weken)

Na twee weken:

Telefonisch consult door huisarts

- Voldoet praktisch gebruik van het middel
- Bijwerkingen?
- Benadruk nogmaals therapietrouw

Controles:

- Nierfunctiecontrole: jaarlijkse bij eGFR > 60 ml/min of halfjaarlijkse controle bij eGFR < 60 ml/min
- Evaluatie gebruik van de NOAC: bijwerkingen, tijdstip van inname etc.

Apotheek:

Eerste uitgifte:

- Verstrekking voor maximaal 15 dagen
- Checkt recept en dosering
- Checkt nierfunctie
- Checkt antistollingslijst o.b.v. het actueel medicatie-overzicht.
- Medicatiebewaking
- Eerste uitgiftebegeleiding door apotheker of gespecialiseerde assistente met aandacht voor therapietrouw

Tweede uitgifte:

- Checkt compliance en motivatie

Na 3 maanden:


- Therapietrouw brief meegeven

Jaarlijks:

- Evaluatie met patiënt: bijwerkingen, therapietrouw
- Checkt nierfunctie



Stichting
Transmurale
Zorg sterk in
verbinden



HAAGSE VATEN

Wat te doen bij ingrepen?

Antistolling behoeft NIET gestaakt te worden bij ingrepen met zeer laag bloedingsrisico:

- Kleine dermatologische excisies
- Tandheelkundige ingrepen

Beleid bij bloeding:

Bij geringe bloeding:

- locale hemostase
- mechanische compressie
- NOAC continueren, max 1 dosis overslaan

Bij ernstige bloeding: Verwijzen naar de tweede lijn.

Keuze tov VKA	Dabigatran 2dd 110 mg of 150 mg	Rivaroxaban 1dd 20 mg	Apixaban 2dd 5 mg	Edoxaban 1dd 60 mg
Effectiviteit Stroke/SE	X		X	
Majeure bloedingen ↓			X	X
Wens tot couperen	X			
Éénmaal daags		X		X
Dyspepsie	X	X		
GDS (Baxter)		X	X	X

NOAC dosis	Reductiefactor(en)	Dosisreductie
Apixaban 2 dd 5 mg	Bij ≥ 2 onderstaande items: Gewicht < 61 kg Kreat > 133 mmol/L Leeftijd > 79 jaar	2 dd 2,5 mg
Dabigatran 2 dd 150 mg	eGFR 30-50 ml/min Leeftijd > 79 jaar Verapamilgebruik of gastritis/ oesofagitis	2 dd 110 mg
Edoxaban 1 dd 60 mg	Gewicht < 61 kg eGFR 15-50 ml/min	1 dd 30 mg
Rivaroxaban 1 dd 20 mg	eGFR 15-50 ml/min	1 dd 15 mg